


Schutz vor HIV nach Stichverletzung - PEP Stand 3.Dez.2019

Health Center Endamarariak Tanzania

PEP: Post Exposure Prophylaxis

Vorgehen bei Stich- Spritz- und Schnittverletzungen von medizinischem Personal

Quelle: Guidelines Kantonsspital St.Gallen <https://kssg.guidelines.ch/guideline/1195>



Definition

Stichverletzung
Perkutane Stichverletzungen | Blutkontakt auf lädierter Haut
(Verletzungen, Abrasionen, Dermatitis) | Blutspritzer auf Schleimhaut
(Augen, Mund)

Prävention:

Handschuhe, Masen, Schutzbrillen, kein Recapping, Aufbewahrung von
Nadeln und Skalpellen in stichfesten Behältern

Sofortmassnahmen:

Waschen mit Seife der Wunde, Desinfizieren

Blutentnahme beim Verletzten:

(Hep B Impfschutz: Titerbestimmung >10-> immun)

Blutentnahme bei der Quellperson

(HIV Schnelltest, HIV 1/2-AK, HIV-Ag und HCV-AK, HCV, HBs-Ag, weitere)

Beginn der HIV PEP


BALDMOEGLICHS! (resp. innert 6h),

Dauer

in der Regel 4 Wochen, falls Quelle HIV + ist

Im Zweifelsfall

PEP beginnen (bevor Testresultat der Quellperson vorliegt) und im Verlauf reevaluieren



Dokumentation Meldeformular ausfüllen <https://kssg.guidelines.ch/guideline/1942/7403>
Fotografie

Wenn HIV-Schnelltest bei Quelle negativ → keine HIV-PEP
Wenn HIV Schnelltest + oder Quellperson bekannt infektiös → HIV PEP

bei Schwangerschaft: Raltegravir-haltige PEP kann auch in der Schwangerschaft abgegeben werden (Isentress)

Durchführung HIV PEP <https://kssg.guidelines.ch/api/filestore/1ozRhySnWKvu5VkkYvX4PQQQeVW3GlllUZ0KyQ/data/info-pep-einnahme-aktuell.pdf>

Im Health Center Endamarariiek ist eine HIV PEP vorrätig. Es finden sich dort

30 Tbl **EMTRICITABIN200mg|TENOFVIRDISOPROXYL 245mg** Ratiopharm . Dieses Medikament ist ein **Genericum von Truvada** mit identischen und dosisäquivalenten Wirkstoffen. (NRTI/ PI)
und

2 Tbl **ISENTRESS 400mg** (Integrasehemmer) .

zu Beginn

je 1 Tbl (**EMTRICITABIN200mg|TENOFVIRDISOPROXYL 245mg Ratiopharm | Isentress 400mg**) **sofort**

je 1 Tbl (**EMTRICITABIN200mg|TENOFVIRDISOPROXYL 245mg Ratiopharm | Isentress 400mg**) **nach 12**
Stunden maximal bis nach 15 Stunden)
und dann

1 Tbl (**EMTRICITABIN200mg|TENOFVIRDISOPROXYL 245mgRatiopharm**) 24 stündlich für 28 Tage .

Tabletteneinnahme nüchtern oder mit dem ESSEN

Nebenwirkungen Uebelkeit, verminderter Appetit, Müdigkeit, Kopfweg, Bauchschmerzen

Unfallmeldung nicht vergessen , Meldeformular ausfüllen

Meldung an G. Heeb, gallus@dr-heeb.ch , sobald PEP Reserve nicht mehr vollständig vorhanden ist und nachgeliefert werden muss.

Aufbewahrung nicht über 30 Grad C lagern, trocken aufbewahren

Datum 2. Dez. 2019 Dr. Gallus Heeb
Redigiert durch

PEP-endamarariiek2019